

Atenționări

- Evitați alimentele prea bogate în celuloză cu câteva zile înainte de recoltare.
- Se va efectua înaintea examenului radiologic în care se folosește sulfatul de bariu
- Se recoltează înainte de a începe tratamentul cu antibiotice.
- Dacă suspectați eliminarea unui parazit sau fragment de parazit (proglote) vizibil cu ochiul liber în materiile fecale, îl veți aduce la laborator într-un recipient curat, bine închis, în care ați pus puțină apă.
- Pentru examenul parazitologic obișnuit veți preleva, cu ajutorul linguriței coprorecoltoarei din prima porțiune a bolului fecal și porțiuni care conțin mucozități, porțiuni sanghinolente sau nedigerate dar care însumate să nu depășească volumul unei alune.
- Nu trebuie să conțină urme de urină.
- Prezența sângelui în probă trebuie precizată.
- La indicația medicului examenul coproparazitologic se poate repeta de 3 sau mai multe ori la interval de 7-10 zile, în funcție de parazitologia suspectată.

Transportul probei

Recipientul, bine închis, va fi transportat la laborator în maxim 2 ore din momentul recoltării, fără mediu de transport.

Atenție!

Corectitudinea rezultatului este mult influențată dacă:

- Probele depășesc cantitatea recomandată.
- Recipientele sunt murdare la exterior și cu scurgeri de lichid.
- Probele au fost păstrate mai mult de 2 ore la domiciliu.